CONSEILS de VACCINATION ANTI-COVID
de la CLIFRANSEP & Dr ZIEGLER, neurologue
(d'après SFSEP, Société Francophone de la SEP)

Nous recommandons vivement
à tout le monde se faire vacciner !

QUELQUES RECOMMANDATIONS

Pour les patients sous ANTI-CD 20 (OCREVUS, RITUXIMAB, TRUXIMA), traitements immunosuppresseurs injectés tous les 6 mois environ :

- nous recommandons de **NE PAS UTILISER DE VACCINS VIVANTS ATTENUES.** (PFIZER, BIOnTECH, MODERNA, ASTRA ZENECA n'en sont pas et sont autorisés)

- **il est possible et préférable de vacciner à tout moment que de ne pas vacciner.**

MAIS DANS LA MESURE DU POSSIBLE

- essayer de **VACCINER AVANT DE COMMENCER LE TRAITEMENT** (dernière dose de vaccin 2 à 4 semaines avant).

- **EVITER** la **VACCINATION** dans le **PREMIER MOIS SUIVANT LA PERFUSION.**

- **REALISER LA VACCINATION 4 à 6 MOIS APRES LA PERFUSION** pour une **MEILLEURE EFFICACITÉ** du vaccin.

Pour les patients avec d'autres traitements (INTERFERONS, COPAXONE, AUBAGIO, TYSABRI, GILENYA, CELLCEPT, IMUREL) :

AUCUNE RESTRICTION (ne pas utiliser de vaccins vivants atténués)

La vaccination peut avoir lieu à n'importe quel moment.

Fait le 18/01/2021